DESCUBRA LA *DIFERENCIA DE ZYRTEC®*

Vea cómo se compara ZYRTEC® con otros medicamentos antialérgicos de 24 horas de venta libre

PARA ADULTOS

Use los productos solo como se indica.

El 92% de los pacientes están satisfechos* con el alivio que obtuvieron con ZYRTEC®

	ZYRTEC®	Claritin®	Allegra®	Xyzal®	Flonase®
La marca más recomendada por los alergistas†	✓				
Comienza a trabajar desde la 1.ª hora[1,2‡]	✓		✓	✓	
Eficacia probada en SAR/PAR	✓	✓	✓	✓	✓
Alivio de 24 horas	✓	✓	✓	✓	✓
No hay advertencias sobre jugos en la etiqueta[3-9]	✓	✓		✓	✓
Aplicación ZYRTEC® ALLERGYCAST®‖ para conocer los recuentos de polen y el clima sobre la marcha ‖Se aplican tarifas de datos estándar.	✓				
Ingrediente activo	cetirizina	loratadina	fexofenadina	levocetirizina	propionato de fluticasona

PAR = rinitis alérgica perenne; SAR = rinitis alérgica estacional.

*Satisfacción definida como la calificación de las dos casillas más altas (5 = muy satisfecho o 4 = algo satisfecho) en una escala de 5 puntos en una encuesta realizada a personas que utilizan ZYRTEC® (n = 300).
†Entre los antihistamínicos orales de venta libre.
‡ZYRTEC® 10 mg empieza a actuar desde la primera hora y Claritin® empieza a actuar desde la tercera hora, según la primera dosis del primer día de un estudio de dos días en dos estudios de cámara de polen. El criterio de valoración principal midió la mejora media desde el valor inicial en la puntuación de gravedad del Complejo de Síntomas Mayores (MSC). Los síntomas del MSC incluían secreción nasal, resoplido, irritación de nariz, sonarse la nariz, estornudos y ojos acuosos.

Compare la diferencia entre ZYRTEC® para Niños y otros antihistamínicos orales de venta libre para niños

PARA NIÑOS

Use los productos solo como se indica.

ZYRTEC® ofrece una garantía de devolución del dinero a quienes no estén completamente satisfechos con el sabor de ZYRTEC® para Niños

	ZYRTEC® para Niños	Claritin® para Niños	Allegra® para Niños	Xyzal® para Niños
La marca más recomendada por los pediatras*	✓			
Dosificación única de 24 horas al día	✓	✓		✓
Formulación en jarabe indicada para niños de 2 años o más	✓	✓	✓	✓
Garantía de sabor de los productos pediátricos de Johnson & Johnson	✓			
Fórmula sin azúcar	✓	✓		
Fórmula sin colorantes	✓	✓	✓	
No hay advertencias sobre jugos en la etiqueta[8-13]	✓	✓		✓
Ingrediente activo	cetirizina	loratadina	fexofenadina	levocetirizina

*Entre los antihistamínicos orales de venta libre.

Recomiende a sus pacientes alérgicos la familia de productos ZYRTEC®.

A la hora de recomendar herramientas para el alivio de la alergia

CONOCER LOS HECHOS MARCA LA DIFERENCIA

Escanear para ver más datos clínicos

Más rápido que Claritin®

ZYRTEC® comienza a actuar **2 horas más rápido** el primer día que los pacientes lo toman (ZYRTEC® a la primera hora y Claritin® a la tercera hora)[1,2]*

El mismo ingrediente activo que Xyzal®

Ambos productos tienen el **mismo enantiómero activo** en cada tableta: levocetirizina 5 mg[5,6]

- ZYRTEC® 10 mg = 5 mg de levocetirizina + 5 mg de dextrocetirizina
- Xyzal® Allergy 24HR 5 mg = 5 mg de levocetirizina

Se desconoce la relevancia clínica de la ausencia de dextrocetirizina.

Mayor alivio que Allegra® entre 21 y 24 horas

ZYRTEC® proporciona un **33% más de alivio** entre las 21 y las 24 horas[14]†

Las mismas advertencias relativas a la somnolencia/ sedación que Xyzal®

ZYRTEC® tiene las mismas advertencias que Xyzal®[5,6] y no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en un ensayo clínico comparativo con tratamiento activo de los efectos sedantes de la levocetirizina y la cetirizina[15]

Use los productos solo como se indica

Recomiende ZYRTEC® a sus pacientes alérgicos.

Y visite ZyrtecProfessional.com para obtener más recursos para sus pacientes, incluyendo aplicaciones de seguimiento de síntomas, videos, folletos educativos, muestras gratis y mucho más.

*ZYRTEC® 10 mg empieza a actuar desde la primera hora y Claritin® empieza a actuar desde la tercera hora, según la primera dosis del primer día de un estudio de dos días en dos estudios de cámara de polen. El criterio de valoración principal midió la mejora media desde el valor inicial en la puntuación de gravedad del Complejo de Síntomas Mayores (MSC). Los síntomas del MSC incluían moqueo, resoplido, irritación de nariz, sonarse la nariz, estornudos y ojos acuosos.

†Basado en la primera dosis del primer día de un estudio de cámara de polen de dos días con ZYRTEC® 10 mg frente a Allegra® 180 mg en las horas 21 a 24. El criterio de valoración primario de la eficacia fue el cambio en la puntuación total de la severidad de los síntomas con respecto al valor inicial en las horas 21 a 24. La puntuación total del complejo de severidad de los síntomas se definió como la suma de las puntuaciones de severidad autoevaluadas de 4 síntomas: moqueo, estornudos, irritación de nariz/paladar/garganta y ojos irritados/acuosos.

Referencias: 1. Day JH, Briscoe M, Widlitz MD. Cetirizine, loratadine, or placebo in subjects with seasonal allergic rhinitis: effects after controlled ragweed pollen challenge in an environmental exposure unit. *J Allergy Clin Immunol*. 1998;101(5):638-645. **2.** Day JH, Briscoe M, Rafeiro E, Chapman D, Kramer B. Comparative onset of action and symptom relief with cetirizine, loratadine, or placebo in an environmental exposure unit in subjects with seasonal allergic rhinitis: confirmation of a test system. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2001;87(6):474-481. **3.** Datos sobre el medicamento Allegra® Allergy 24 Hour. **4.** Datos sobre el medicamento Claritin® 24-Hour. **5.** Datos sobre el medicamento ZYRTEC® 24-Hour. **6.** Datos sobre el medicamento Xyzal® Allergy 24HR. **7.** Datos sobre el medicamento FLONASE®. **8.** Allegra® [prospecto]. Bridgewater, NJ: Sanofi-Aventis U.S. LLC; 2007. **9.** Preguntas frecuentes. Allegra. Consultado el 4 de noviembre de 2020. https://www.allegra.com/en-us/faq-what-are-seasonal-allergies/ **10.** Datos sobre el medicamento Allegra® para Niños. **11.** Datos sobre el medicamento Claritin® Oral Solution para Niños. **12.** Datos sobre el medicamento ZYRTEC® Allergy Syrup para Niños. **13.** Datos sobre el medicamento Xyzal® Allergy 24HR Oral Solution para Niños. **14.** Day JH, Briscoe MP, Rafiero E, Hewlett D, Chapman D, Kramer B. Randomized double-blind comparison of cetirizine and fexofenadine after pollen challenge in the environmental exposure unit: duration of effect in subjects with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2004;25(1):59-68. **15.** Tzanetos DB, Fahrenholz JM, Scott T, Buchholz K. Comparison of the sedating effects of levocetirizine and cetirizine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2011;107(6):517-522.

Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Johnson & Johnson Consumer Inc. 2021

ZYR-56804